


Entreprises de la filière

L'annuaire Peupliers de France référence les entreprises ayant une activité significative en lien avec le peuplier. Les entreprises peuvent s'y inscrire gratuitement sur la base du volontariat.



Carte 1 : Localisation des entreprises ayant une activité en lien avec le peuplier

En région Grand Est, on trouve pour l'année 2021 sur l'annuaire :

- 3 pépiniéristes
- 3 organismes de gestion en commun et autres gestionnaires forestiers
- 9 exploitants forestiers
- 3 scieries
- 2 entreprises de déroulage


Consultez l'annuaire Peupliers de France en cliquant [ici](#).

Surfaces en peupleraies

Les méthodes existantes d'évaluation des surfaces forestières sont peu adaptées au peuplier. Les chiffres qui suivent sont donnés à titre indicatif.

Source de la donnée	Surface en peupleraies estimée en ha
Inventaire forestier national 2016-2020	22 000 ± 6 000
Cadastre 2016	32 884

Une étude menée par le Conseil National du Peuplier par télédétection satellitaire devrait permettre d'avoir des données plus précises sur les surfaces en peupleraies et leur localisation à partir de 2023.



Carte 2 : Localisation des secteurs populicoles dans le grand quart Nord-Est de la France

Les peupleraies du Grand Est représenteraient entre 10 et 15 % de la surface nationale. Environ 85 % de ces peupleraies se situent en ex-Champagne-Ardenne, tout particulièrement dans les départements de la Marne et de l'Aube.

Récolte et production de sciages en Grand Est (source : agreste)

Nous observons ces dernières années une augmentation de la récolte de peuplier ainsi qu'une forte progression de la proportion de bois d'œuvre de peuplier destinée au déroulage.

En 2020 :

Récolte de bois d'œuvre déroulage	Récolte de bois d'œuvre sciage	Total récolte bois d'œuvre
108 000 m ³	40 000 m ³	148 000 m ³




Figure 1 Récolte de peuplier en milliers de mètres cubes

Oscillant pendant longtemps autour d'une moyenne de 50 %, la part de déroulage a dépassé les 70 % en 2020. Le Grand Est se rapproche ainsi de la moyenne nationale qui s'élevait à 77 % en 2019. Le regain d'intérêt des industriels peut expliquer en partie ces deux tendances (augmentation de la récolte et du taux de déroulage) déjà observées dans d'autres régions. Les volumes de sciages sont en baisse mais dans une moindre proportion. Cette baisse concerne principalement les sciages de peuplier de moindre qualité.




Figure 2 Part de bois d'œuvre de peuplier destinée au déroulage

Plançons produits et commercialisés par les pépinières du Grand Est (Source : Enquête pépinières - DRAAF GE)




Figure 3 Nombre de plançons produits et commercialisés par les pépinières du Grand Est par catégorie

Après une forte baisse de la production de plants en Grand Est depuis la tempête de 1999 et jusqu'en 2014, les chiffres sont à la hausse du fait d'une nouvelle dynamique (+30 000 plants produits entre 2019 et 2020).




Figure 4 Répartition des plançons produits et commercialisés dans le Grand Est par cultivar

Nous observons également une diversification des cultivars commercialisés. Avant les années 2000, les interaméricains dominaient le marché, puis ils ont été remplacés en partie par les I214. Enfin depuis les années 2010, nous constatons une augmentation des productions de koster et une large utilisation des nouveaux cultivars, fruits de la recherche et largement testés dans un réseau d'expérimentation national.

Taux de renouvellement des peupleraies en % (source : agreste et enquête pépinière)

Postulat : 1 peuplier = 1 m³




Figure 5 Taux de renouvellement des peupleraies en Grand Est

Ce graphique ne tient pas compte des flux de plançons interrégionaux. La région Grand Est importe beaucoup plus de plançons de peuplier qu'elle n'en exporte, le taux de renouvellement basé sur l'enquête pépinière est donc sous-évalué.

Selon la mise à jour de l'étude prospective sur la ressource en peuplier (mai 2022), le taux de renouvellement des peupleraies du bassin Nord-Nord-Est, prenant en compte les flux entre région, est de 130% en 2020 (regain de surface en peupleraies).

Résumé de la situation sanitaire 2021 (Source : Pôle santé des forêts - DRAAF GE)

Le puceron lanigère n'a pas été observé en 2021. Mais de fortes mortalités ont été constatées dans la Marne et l'Aube suite aux attaques de 2020. Les cultivars les plus impactés sont le Triplo et le I214.

Des défoliations (fortes à totales) de peuplements ont été observées dans la Marne, du fait du bombyx disparate et de la chenille crénelée, et dans l'Aube, du fait de bombyx du saule et de géométrides.

Enfin, les maladies foliaires se sont peu manifestées en 2021. Quelques cas de rouille sur les peupliers interaméricains ont été signalés dans la Marne à partir de mi-juillet. De la rouille a également été observée sur le cultivar AF8 en fin de saison. Notons enfin que pour un interaméricain le Raspalje semble présenter une certaine tolérance à la rouille.